



223 - HEPATITIS A Y BROTES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

M.R. Heredia Ruiz, J.A. Villén Santiago, A.I. Marroquí Calero, C. Blanco Maldonado, A.M. Guerrero Serrano

Servicio Andaluz de Salud; Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias (Junta de Andalucía).

Resumen

Antecedentes/Objetivos: El objetivo fue determinar si existió un exceso de casos de hepatitis A en la provincia de Málaga durante el primer semestre de 2025 en comparación con los periodos homólogos de los cinco años previos, así como caracterizar y analizar los brotes ocurridos en dicho periodo y describir las medidas de control implementadas.

Métodos: Estudio longitudinal descriptivo de los casos de hepatitis A notificados y asociados a brotes en la provincia de Málaga entre enero y junio 2025, mediante análisis descriptivo con medidas numéricas para variables cuantitativas y frecuencias para las variables cualitativas.

Resultados: Durante el periodo de estudio se notificaron 65 casos de hepatitis A, evidenciando un exceso de casos, con un índice epidémico de 7,22. La tasa de incidencia provincial fue de 1,8 casos por 100.000 habitantes para los casos no asociados a brotes y de 3,67 casos por 100.000 habitantes de forma global. Los distritos sanitarios Valle del Guadalhorce y Costa del Sol presentaron las tasas de incidencia más elevadas. Del total de casos, 33 (50,76%) se asociaron a cinco brotes, identificándose uno por transmisión sexual y cuatro persona a persona. Dos casos presentaron antecedente de viaje durante el periodo de incubación y ninguno de los casos con indicación de vacunación había recibido la vacuna previamente. El brote de mayor magnitud afectó a 17 personas y se desarrolló en los ámbitos escolar y familiar. Las principales medidas de control implementadas incluyeron la búsqueda activa de casos, inspecciones sanitarias, la administración de profilaxis posexposición y el refuerzo de las recomendaciones sobre higiene, limpieza y desinfección.

Conclusiones/Recomendaciones: Se considera necesario insistir en la importancia de la consulta médica previa a los viajes internacionales, especialmente cuando el destino incluye regiones de alta endemicidad o con condiciones sanitarias deficientes, así como reforzar la comunicación y difusión de medidas preventivas dirigidas a los colectivos implicados.