Gac Sanit. 2026;40(S4):698

Gaceta Sanitaria

https://www.gacetasanitaria.org

109 - ESTADO DE SALUD AUTOPERCIBIDO DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SÍNDROME DEL ACEITE TÓXICO, COMPARADO CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

D. López de la Iglesia, G. Sánchez Díaz, R. Sarmiento Suárez, G. Rodelo Olmos, V. Alonso Ferreira, E. Bermejo Sánchez, G. Arias Merino

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER); Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER); Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Resumen

Antecedentes/Objetivos: El síndrome del aceite tóxico (SAT) se originó en España en 1981 como consecuencia de la ingesta de aceite de colza adulterado, afectando a más de 20.000 personas. El objetivo de este estudio es describir la evolución del estado de salud autopercibido (ESA) en la población del rango de 45-64 años de la cohorte SAT, y compararla con la población española.

Métodos: Los datos se extrajeron de la plataforma SAT I+D+i del IIER-ISCIII, y de las Encuestas Nacionales de Salud (ENS) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambas plataformas preguntan sobre la autopercepción del ESA en el último año. Las respuestas están catalogadas en escala Likert (1: muy bueno, 2: bueno, 3: regular, 4: malo y 5: muy malo). Para el análisis se agrupó el ESA en tres categorías (1 y 2: Bueno, 3: Regular, y 4 y 5: Malo) y se seleccionó el estrato de edad de 45-64 años. Se compararon ajustándolos a la población europea de 2013, usando los años en que el INE realizó la ENS (2009, 2012, 2014, 2017, 2020 y 2023). Además, se comparó el ESA de la cohorte SAT por sexo.

Resultados: Entre 1995-2023, el porcentaje de mujeres entre 45-64 años de la cohorte SAT que respondieron tener un ESA “Bueno” fue inferior al de los hombres. Por el contrario, mayor porcentaje de mujeres refirió encontrarse en “Regular o Mal estado

0213-9111 © 2026 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados

de salud”. Esta tendencia es constante para este periodo. La percepción de un ESA “Malo” fue mayor entre 1995-2000, para ambos sexos respecto al resto de años. Al comparar los datos del ESA entre la cohorte SAT y la población española (INE), el porcentaje de personas que refiere un ESA “Malo” fue mayor en la cohorte SAT en todos los años analizados y esta diferencia fue estadísticamente significativa: (2009: 12,67 vs. 9,73%; 2012: 17,54 vs. 8,46%; 2014: 16,58 vs. 9,27%; 2017: 17,34 vs. 9,27%; 2020: 17,79 vs. 6,99%; y 2022: 20,00 vs. 7,65%). En ambas poblaciones, un mayor porcentaje de mujeres refiere un ESA “Malo”.

Conclusiones/Recomendaciones: La cohorte afectada por el SAT entre 45-64 años, en particular las mujeres, presenta un estado de salud peor que la población española, y este deterioro de la salud puede comprometer la capacidad para mantener una actividad laboral normal, subrayando la necesidad de intervenciones específicas orientadas a minimizar su impacto funcional y social a largo plazo.

0213-9111 © 2026 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados