Gac Sanit. 2026;40(S4):37

Gaceta Sanitaria

https://www.gacetasanitaria.org

664 - ENFERMEDAD DE HUNTINGTON: LUGAR DE MUERTE Y FACTORES ASOCIADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 2010-2023

J.P. Chalco-Orrego, M. Gutiérrez-Moronta, R. Gènova-Maleras, M.D. Esteban-Vasallo, L.M. Blanco-Ancos, E. García-García, M.F. Domínguez-Berjón

Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Resumen

Antecedentes/Objetivos: La enfermedad de Huntington (EH) es un trastorno neurodegenerativo con movimientos coreicos, trastornos conductuales, psiquiátricos y demencia. Suele aparecer entre los 30-50 años de edad y progresa hasta la dependencia total. Los objetivos fueron describir el lugar de muerte por EH y factores sociodemográficos asociados en la Comunidad de Madrid (CM) entre 2010-2023.

Métodos: Se seleccionaron del Registro de Mortalidad las defunciones de residentes en la CM con EH como causa básica de defunción (código CIE10: G10). Se analizó el lugar de muerte: centro hospitalario (CH), residencia sociosanitaria (RS) y domicilio particular (DP) y su asociación con: año y edad de fallecimiento, sexo, nivel educativo, estado civil y municipio de residencia. Se realizó un análisis descriptivo, con el cálculo de *odds ratio* (OR) con su intervalo de confianza al 95% (IC95%) mediante regresión logística.

Resultados: Constan 142 defunciones (52,1% hombres). La media de edad de muerte fue de 61,7 años; hombres (H) 59,0 y mujeres (M) 64,6 años. El 49,3% falleció en CH (H: 59,5%, M: 38,2%); en RS 28,2% (H: 20,3%, M: 36,8%) y en DP un 11,3% (H: 8,1%, M: 14,7%) siendo las diferencias por sexo estadísticamente significativas (para H un OR: 2,8 IC95%: 1,3-5,8 de morir en CH). En los < 45 años un 56,3% falleció en CH, 18,8% en DP y 12,5% en RS; en los de 45-64 años, un 56,3%, 10,9% y 25,0%; y en > 64 años un 40,3%, 9,7% y 35,5%, respectivamente. Morir en CH se asoció inversamente a la edad (OR: 0,97, IC95%: 0,95-1,00). En personas solteras, un 51,3%

0213-9111 © 2026 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados

falleció en CH y un 28,2% en RS; en casadas un 48,5% y un 26,5%; en viudas un 55,0% y un 25,0% y en separadas un 35,7% y un 42,9%, respectivamente; sin diferencias significativas. En el municipio de Madrid un 43,9% falleció en CH y un 33,3% en RS; en corona metropolitana un 56,1% y un 17,5%, y en el resto de la CM un 47,4% y un 42,1%, respectivamente, sin diferencias significativas. Se observó un gradiente de morir en CH a mayor nivel de estudios (38,1% con estudios primarios y 63,6% con estudios universitarios). No se observaron cambios temporales en el lugar de muerte. Ajustando por edad los hombres tenían 2,5 veces más probabilidad de fallecer en CH (IC95% 1,2-5,3).

Conclusiones/Recomendaciones: El lugar de muerte más frecuente por EH es el hospital. En los hombres se duplica la probabilidad de fallecer en hospital, respecto a las mujeres, independientemente de la edad de fallecimiento.

0213-9111 © 2026 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados