



795 - BROTES DE ESCABIOSIS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2024

E. Mansilla Ferrer, C. Vicedo García, F.J. Roig Sena

Dirección General de Salud Pública.

Resumen

Antecedentes/Objetivos: La escabiosis es una infestación por el ácaro *Sarcoptes scabiei hominis* catalogada por la OMS como enfermedad tropical desatendida. Antiguamente asociada a la pobreza y la poca higiene esta se da en un gran número de países y sin importar el nivel económico. Al no tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria no hay un seguimiento de los casos individuales sino de los brotes epidémicos, entendiendo como brote 2 o más casos con relación epidemiológica. En los últimos años se ha observado un aumento de brotes de escabiosis. **Objetivos:** describir la evolución de la escabiosis en la Comunitat Valenciana (CV) durante el período a estudio (2014-2024).

Métodos: Mediante el sistema AVE (Análisis de Vigilancia Epidemiológica) de la Comunitat Valenciana obtenemos los datos de los brotes declarados durante el período. Las variables de interés son: casos por brote, año de declaración, semana de declaración, ámbito epidemiológico (Residencia de mayores, Familiar, Centro educativo, Diversidad funcional, Centro menores, Nosocomial, No convivientes, Centro acogida, Otros vulnerables y Laboral).

Resultados: En total durante el período a estudio (2014-2024) en la CV se han declarado 320 brotes de escabiosis con 2073 casos asociados. Siendo el año 2023 el año con más brotes y casos declarados con 95 brotes (29,7%) y 514 casos notificados (24,8%). La clasificación de brotes de escabiosis por ámbito durante el período a estudio en la CV 110 brotes (34,4%) y 432 casos (20,9%) asociados en el ámbito familiar, 77 brotes (24,1%) y 931 casos (45%) en el ámbito residencias mayores seguido por los centros educativos con 44 brotes (13,75%) y 247 casos (11,92%). La media de casos por brote varía según ámbito, en los brotes familiares con 3,93 casos/brote, los brotes en centros educativos con 5,61 casos/brote y los 12,09 casos/brote de media en las residencias de mayores.

Conclusiones/Recomendaciones: Los brotes de escabiosis en la CV durante el período a estudio presentan 2 picos de incidencia, uno en el año 2018 donde se declararon 39 brotes y 222 casos asociados y en el año 2023 donde se declararon 95 brotes de escabiosis con 514 casos asociados. Durante el año 2020 coincidiendo con la situación pandémica a causa del SARS-CoV-2 se declaró un menor número de brotes por año con 6 brotes y 35 casos asociados. La importancia de tomar las medidas adecuadas en los casos y contactos de escabiosis en los brotes en el ámbito de las residencias de mayores, debido a que suelen tener un tamaño de brote mayor (12,09 casos/brote).