



917 - TUBERCULOSIS. INFORME EPIDEMIOLÓGICO. CEUTA 2003-2025

S. Holguín Galvis, S. Aazzouzi Raiss, M. Domínguez Padilla, S. Montenegro

Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario de Ceuta.

Resumen

Antecedentes/Objetivos: Según la OMS a nivel mundial la tuberculosis es la enfermedad transmisible con mayor mortalidad. Según el INE en España la incidencia es de 10,59 casos por 100.000 habitantes en el 2015. Según la RENAVE para el 2023 hay 28,9 casos por 100.000 habitantes para Ceuta. La mayor tasa registrada en España. Este estudio quiere describir epidemiológicamente la tuberculosis en Ceuta durante los años 2003 a 2025.

Métodos: Con datos del Sistema de Vigilancia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante los años 2000 a 2025. Se seleccionaron los casos autóctonos. Se tomó la cantidad de población total para la Ciudad Autónoma de Ceuta del Instituto Nacional de Estadística-INE para los años 2003-2025, para el cálculo de las tasas. Para el análisis descriptivo se utilizó Excel.

Resultados: Se encontraron 505 casos. El primer caso notificado fue del 2003. De los cuales 397 (78,6%) casos son autóctonos y 103 (20,3%) casos son importados. Para el 2003 hubo 29,36 casos por 100.000 habitantes. Para el año 2025 hubo 11,95 casos por 100.000 habitantes. Con un descenso del 59%. La distribución de los casos según el lugar de nacimiento es en su mayoría España con 352 casos que representan el 89%, seguido de Marruecos con 18 casos que representan el 5%. La distribución de los casos según el lugar de residencia se da principalmente en Ceuta con 361 casos que representan el 91%. Respecto a los casos según género, se encontraron 18,68 casos en hombres para el 2003 y 9,56 casos por 100.000 habitantes para el 2025. Con un descenso de 48%. Se encontraron 10,68 casos en mujeres para el 2003 y 2,39 casos por 100.000 habitantes para el 2025. Con un descenso del 77%. Según edad y género, se encontró para el 2003 mayor incidencia en la población menor a 40 años. Y para el 2025 se encontró mayor incidencia en la población de 11 a 20 años y en la población de 51 a 60 años. Hubo 321 casos a nivel pulmonar, y 43 casos a nivel pleural. Requirieron hospitalización 245 casos (62%). Y hubo un fallecimiento de 8 casos (2%). Según los factores de riesgo de los casos notificados con tuberculosis en Ceuta de 2003 a 2025 se encontró consumo de alcohol en 10 casos (3%) y de drogas endovenosas en 9 casos (2%). Respecto al tratamiento, y el resultado posterior al inicio del tratamiento se encontró curación en 38 casos (10%), un tratamiento completo en 29 casos (7%).

Conclusiones/Recomendaciones: Se recomienda mejorar los procesos de notificación e iniciar un proceso de seguimiento para saber la carga por morbilidad real o resultado de manejo asociadas a la tuberculosis. Entender las características de la población afectada nos permite adoptar mejores medidas de prevención, diagnóstico, control y manejo.