

Original

Fallecimientos por COVID-19: comparación entre datos de vigilancia epidemiológica y del Instituto Nacional de Estadística



Sandra Campos^{a,*}, Marcos Lozano Álvarez^{b,c}, María Sastre^{b,c}, Elena Vanessa Martínez^{c,d}, María José Sierra^{d,e}, Diana Gómez-Barroso^{b,c} y Susana Monge^{a,b,e}

^a Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública, Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España

^b Departamento de Enfermedades Transmisibles, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España

^c CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España

^d Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Dirección General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad, Madrid, España

^e CIBER de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC), España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 22 de abril de 2025

Aceptado el 7 de agosto de 2025

On-line el 25 de septiembre de 2025

Palabras clave:

COVID-19

SARS-CoV-2

Mortalidad

Sistema de vigilancia

Instituto Nacional de Estadística

RESUMEN

Objetivo: Comparar los fallecimientos por COVID-19 notificados diariamente por las comunidades autónomas al Sistema para la Vigilancia en España (SiVIES) con los datos consolidados del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre marzo de 2020 y diciembre de 2022.

Método: Se analizó el número de fallecidos por COVID-19 confirmada registrados en el SiVIES y en el INE (código CIE-10 U07.1 como causa básica de defunción) según periodo de mortalidad, sexo, edad y comunidad autónoma. Posteriormente se incluyeron los fallecidos con sospecha de COVID-19 (INE: código U07.2; SiVIES: posibles o probables, notificados hasta mayo de 2020).

Resultados: En el SiVIES se notificaron 118.557 defunciones por COVID-19 confirmada, un 9,8% menos que en el INE (131.408). La diferencia fue menor en los periodos centrales (entre -5,7% y -7,9%) y mayor en las mujeres (-11%), en personas ≥ 80 años (-12%) y en Cataluña y Galicia (-18%). Al incluir sospecha de COVID-19, la diferencia aumentó del -13% al -36% en el primer periodo (hasta junio de 2020), cuando ambas fuentes recogían los casos sospechosos, mientras que en los períodos posteriores las diferencias fueron menores, aunque en el SiVIES solo se notificaban los casos confirmados.

Conclusiones: La diferencia de fallecidos por COVID-19 confirmada notificados en el SiVIES en comparación con el INE fue < 10% globalmente, con diferencias por grupos de edad, sexo y comunidad autónoma. Las menores diferencias después del primer periodo podrían atribuirse a la mejora del sistema de vigilancia, y la amplia disponibilidad de pruebas diagnósticas explicaría el bajo impacto de incluir los casos sospechosos.

© 2025 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la CC BY licencia (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

COVID-19 deaths: a comparison between epidemiological surveillance data and the National Institute of Statistics data

ABSTRACT

Keywords:

COVID-19

SARS-CoV-2

Mortality

Surveillance system

National Statistics Institute

Objective: To compare the number of COVID-19 deaths reported daily by the autonomous communities to System for Surveillance in Spain (SiVIES) with the consolidated data from the National Statistics Institute (INE) between March 2020 and December 2022.

Method: The number of confirmed COVID-19 deaths recorded in SiVIES and the INE (ICD-10 code U07.1 as the underlying cause of death) was analysed by mortality period, sex, age, and autonomous community. In a second step, deaths with suspected COVID-19 (INE: ICD code U07.2; SiVIES: possible or probable cases, notified up to May 2020) were included.

Results: In SiVIES, 118,557 confirmed COVID-19 deaths were reported, 9.8% fewer than in the INE (131,408). The difference was smaller in the central periods (between -5.7% and -7.9%) and larger in women (-11%), those aged ≥ 80 (-12%), and in Catalonia and Galicia (-18%). When including suspected COVID-19, the difference increased from -13% to -36% in the first period (until June 2020), when both sources collected suspected cases. In later periods, the differences were smaller, despite SiVIES reporting only confirmed cases.

Conclusions: The difference in confirmed COVID-19 deaths reported in SiVIES vs. INE was < 10% overall, with differences by age, sex, and autonomous community. The smaller differences after the first period may be attributed to improvements in the surveillance system, and the widespread availability of diagnostic tests may explain the low impact of including suspected cases.

© 2025 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

* Autora para correspondencia.

Correo electrónico: sandra.campos@isciii.es (S. Campos).

Introducción

La COVID-19 es la enfermedad producida por el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-CoV-2), un nuevo coronavirus identificado por primera vez en Wuhan, China, a principios de enero de 2020¹. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional², y el 12 de marzo declaró la pandemia³. En España, el primer caso confirmado se detectó el 31 de enero de 2020 y el primer fallecimiento fue el 13 de febrero. Hasta el fin de la crisis sanitaria, el 4 de julio de 2023⁴, se notificaron 13.914.811 casos⁵ y 122.057 fallecimientos⁶. La monitorización en tiempo real de los casos y los fallecimientos es vital para responder adecuadamente durante situaciones de crisis^{7,8}.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE)⁹ es coordinada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y gestionada por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), a través de la plataforma informática del Sistema de Vigilancia en España (SiVIES). Durante los primeros meses de la pandemia, las comunidades autónomas notificaron diariamente al CCAES de manera agregada el número de casos de COVID-19 confirmados, probables y posibles/sospechosos, hospitalizados, ingresados en la unidad de cuidados intensivos, fallecidos y recuperados. A partir del 11 de mayo de 2020¹⁰ se estableció la notificación obligatoria individualizada al SiVIES solo de los casos confirmados, incorporando de manera retrospectiva aquellos que no se hubieran incluido previamente. A partir del 28 de marzo de 2022¹¹, la notificación obligatoria se limitó a poblaciones con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas), ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves (con ingreso hospitalario o fallecimiento). Durante la pandemia, la mortalidad por COVID-19 fue analizada diariamente por el CCAES¹² y semanalmente por el CNE¹³. Esta información de vigilancia, que se usó en tiempo real para la toma de decisiones, pudo ser incompleta, contener errores o sufrir retrasos^{7,14,15}.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge la información del Certificado Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción y codifica las causas de muerte (inmediatas, intermedias, fundamentales y contribuyentes) según establece la OMS en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)¹⁶. Esta codificación permite una categorización estandarizada de las causas de muerte y facilita la determinación de la causa principal, denominada causa básica (CBAS). Estos datos podrían ofrecer mayores garantías de calidad⁸, pero su tiempo de consolidación y disponibilidad es superior a 1 año, haciéndolo inviable en situación de pandemia.

Este estudio tiene como objetivo evaluar la sensibilidad de la vigilancia de los fallecimientos por COVID-19 notificados a la RENAVE a través de SiVIES (en adelante, casos SiVIES) comparándolos con los recogidos por el INE según la CBAS, en distintos momentos de la pandemia. Como objetivo secundario, se analizarán los fallecimientos por COVID-19 del INE considerando adicionalmente la causa fundamental o intermedia.

Método

Diseño del estudio y fuentes de información

Se realizó un estudio ecológico de comparación de datos agrupados de mortalidad por COVID-19 a partir de dos fuentes de información con cobertura estatal: la vigilancia epidemiológica utilizada para el seguimiento de la pandemia (SiVIES) y los datos consolidados de mortalidad por causas del INE, para el periodo desde el inicio de la pandemia hasta diciembre de 2022. Como unidad de análisis se tomó el total estatal o por comunidades autónomas, así como el total del periodo de estudio o subperiodos de este.

Se extrajeron del SiVIES, a fecha 26 de diciembre de 2023, los casos cuyo resultado final fue el fallecimiento. Como fecha del caso se tomó la fecha de inicio de los síntomas o, en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en caso de faltar ambas, la fecha clave (fecha para estadísticas reportada por la comunidad autónoma). Se obtuvo información de sexo, edad (en años cumplidos en el momento del diagnóstico de COVID-19), comunidad autónoma de notificación, comunidad autónoma de residencia, clasificación del caso (confirmado o, antes del 11 de mayo de 2020, probable o posible), fecha de defunción y causa de defunción (COVID-19, desconocida u otra). Las fechas de fallecimiento desconocidas se imputaron utilizando la mediana entre la fecha del caso y la fecha de defunción de los sujetos con información disponible (13 días).

Se tomaron como fallecimientos por COVID-19 aquellos con causa COVID-19 o desconocida, entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, con información de sexo, edad y comunidad autónoma de residencia (salvo si era desconocida, que se tomó la de notificación). Los casos sin información de clasificación se consideraron confirmados, los únicos notificados a partir del 11 de mayo de 2020.

Se analizaron los ficheros de microdatos anonimizados de mortalidad por causas del INE (en adelante, defunciones del INE) entre 2020 y 2022. Se seleccionaron fallecidos con los códigos U07.1 (casos confirmados de COVID-19, virus identificado) o U07.2 (casos sospechosos de COVID-19, virus no identificado) en alguna de las causas (básica, fundamental o intermedia) de defunción^{16,17}. Se recabaron el sexo, la edad (en años cumplidos en el momento del fallecimiento), la fecha de fallecimiento y la comunidad autónoma de residencia (salvo si era desconocida, en cuyo caso se tomó la del fallecimiento).

Análisis de los datos

Se analizó el número de fallecidos por COVID-19 en ambas fuentes según comunidad autónoma, sexo, edad (0-14, 15-44, 45-64, 65-79 y ≥80 años) y periodo de mortalidad (según fecha de defunción), estableciendo seis períodos mediante examen visual de las ondas observadas (Fig. 1): periodo 1 (P1, de marzo a junio de 2020), periodo 2 (P2, de julio a noviembre de 2020), periodo 3 (P3, de diciembre de 2020 a mayo de 2021), periodo 4 (P4, de junio a octubre de 2021), periodo 5 (P5, de noviembre de 2021 a abril de 2022) y periodo 6 (P6, de mayo a diciembre de 2022).

Para analizar la sensibilidad del sistema vigilancia se realizó una comparación entre los fallecimientos notificados en el SiVIES y los registrados según la CBAS en el INE. Se analizaron los fallecidos por COVID-19 confirmada (INE: código U07.1) y, adicionalmente, sumando los casos posibles y probables (INE: código U07.2; en el SiVIES únicamente los notificados hasta mayo de 2020). Se calculó el porcentaje de diferencia en la notificación entre ambas fuentes.

Para el objetivo secundario se calculó el incremento en el número de fallecimientos en el INE, según si el código U07.1 constaba como CBAS o considerando adicionalmente las causas fundamental e intermedia.


Se utilizó el programa estadístico Stata v16. No fue necesario solicitar aprobación al Comité de Ética, al enmarcarse en los objetivos de vigilancia epidemiológica nacional.

Resultados

Sensibilidad del Sistema de vigilancia de fallecimientos por COVID-19

Durante el periodo de estudio se registraron 118.557 fallecidos por COVID-19 confirmada en el SiVIES y 131.408 en el INE,

Considerando solo los casos confirmados



Considerando los casos confirmados, probables y posibles




Figura 1. Número de fallecidos por COVID-19, por mes de fallecimiento, según la fuente de datos (SiVIES o INE), y porcentaje de fallecidos no registrados en SiVIES. España, marzo de 2020 a diciembre de 2022. P1: primer periodo (del 1 de marzo al 30 de junio de 2020); P2: segundo periodo (del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020); P3: tercer periodo (del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021); P4: cuarto periodo (del 1 de junio al 31 de octubre de 2021); P5: quinto periodo (del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022); P6: sexto periodo (del 1 de mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2022).

resultando en una diferencia del -9,8% en el SiVIES respecto al INE. Añadiendo los casos posibles y probables, el número ascendió a 119.188 en el SiVIES y a 146.550 en el INE, y la diferencia de notificación se elevó al -19% ([Tabla 1](#)). La evolución temporal fue muy similar en ambas fuentes de datos. La notificación en el SiVIES y el INE fue más concordante en los períodos centrales de la pandemia (P3 y P4), observándose la mayor diferencia en el primer periodo (-13% en casos confirmados y -36% considerando también los posibles y probables) y en el último (-16% en casos confirmados) ([Fig. 1](#) y [Tabla 1](#)).

La diferencia entre el SiVIES y el INE fue ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres ([Tabla 1](#)), tanto para los casos confirmados (-11% vs. -9,0%) como para el total de los casos (incluyendo probables y posibles, -22% vs. -17%). Considerando solo los casos confirmados ([Fig. 2](#)), la mayor diferencia de notificación entre mujeres y hombres se dio en los períodos 1 (-16% vs -11%) y 6 (-18%

vs. -14%). La estratificación por grupo etario (véase el [Material suplementario](#)) reveló una mayor diferencia de notificación en las mujeres del grupo de edad ≥ 80 años durante los períodos 1 (-18% vs. -14%) y 6 (-22% vs. -20%), si bien al considerar la edad año a año, en vez de en grupos amplios, no se observa una diferencia sistemáticamente mayor en las mujeres respecto a los hombres (véase el [Material suplementario](#)). En menores de 15 años, en varones se notificaron 25 fallecimientos por COVID-19 confirmada en el SiVIES, frente a 15 en el INE. En contraste, en las mujeres el número fue más similar, con 15 casos en el SiVIES y 17 en el INE.

Por grupos de edad, la diferencia entre el SiVIES y el INE ([Tabla 1](#)) fue mayor en las personas ≥ 80 años, tanto para casos confirmados (-12%) como para el total de los casos (-23%). Por el contrario, en menores de 15 años, el número de fallecimientos notificados fue mayor en el SiVIES, tanto para casos confirmados (+25%) como para

Tabla 1

Número de fallecimientos por COVID-19 registrados en el SiVIES y en el INE, y porcentaje de diferencia entre ambas fuentes, por períodos de mortalidad, sexo, grupos de edad y comunidad autónoma de residencia. España, marzo de 2020 a diciembre de 2022

Variable	Categorías	N.º fallecidos SiVIES (confirmados)	N.º fallecidos INE (U07.1)	Diferencia SiVIES vs. INE (%)	N.º fallecidos SiVIES (confirmados, probables y posibles)	N.º fallecidos INE (U07.1, U07.2)	Diferencia SiVIES vs. INE (%)
Total		118.557	131.408	-9,80	119.188	146.550	-18,7
Periodo de mortalidad	Periodo 1 (01/03/20-30/06/20)	29.128	33.312	-12,6	29.759	46.662	-36,2
	Periodo 2 (01/07/20-30/11/20)	19.223	20.861	-7,85	19.223	21.865	-12,1
	Periodo 3 (01/12/20-31/05/21)	32.907	34.901	-5,71	32.907	35.516	-7,35
	Periodo 4 (01/06/21-31/10/21)	7.048	7.562	-6,80	7.048	7.640	-7,75
	Periodo 5 (01/11/21-30/04/22)	17.026	19.043	-10,6	17.026	19.122	-11,0
	Periodo 6 (01/05/22-31/12/22)	13.225	15.729	-15,9	13.225	15.745	-16,0
Sexo	Hombre	65.211	71.655	-8,99	65.487	78.418	-16,5
	Mujer	53.096	59.753	-11,1	53.451	68.132	-21,6
	Desconocido	249	0	NA	249	0	NA
	No consta	1	0	NA	1	0	NA
Grupo de edad (años)	< 15	40	32	25,0	40	34	17,7
	>15 y <45	998	927	7,66	1.002	993	0,91
	≥45 y <65	9.923	10.167	-2,40	9.945	10.783	-7,77
	≥65 y <80	31.868	34.052	-6,41	32.003	36.415	-12,1
	≥80	75.521	86.230	-12,4	75.991	98.325	-22,7
	Desconocido	207	0	NA	207	0	NA
Comunidad autónoma	Andalucía	15.460	16.938	-8,73	15.460	17.736	-12,8
	Aragón	5.451	5.388	1,17	5.451	5.714	-4,60
	Asturias, Principado de	3.428	3.801	-9,81	3.428	4.122	-16,8
	Baleares, Islas	1.624	1.746	-6,99	1.624	1.791	-9,32
	Canarias	2.171	2.409	-9,88	2.176	2.524	-13,8
	Cantabria	979	1.074	-8,85	979	1.143	-14,4
	Castilla y León	9.361	11.063	-15,4	9.361	12.999	-28,0
	Castilla-La Mancha	8.035	8.240	-2,49	8.035	9.936	-19,1
	Cataluña	20.558	25.117	-18,2	21.100	28.201	-25,2
	Ceuta	193	173	11,6	193	185	4,32
	Comunidad Valenciana	10.204	11.218	-9,04	10.266	11.995	-14,4
	Extremadura	2.679	3.053	-12,3	2.679	3.354	-20,1
	Galicia	4.012	4.896	-18,1	4.012	5.015	-20,0
	Madrid, Comunidad de	21.113	24.445	-13,6	21.113	29.311	-28,0
	Melilla	170	168	1,19	170	172	-1,16
	Murcia, Región de Navarra, Comunidad Foral	2.513	2.685	-6,41	2.513	2.743	-8,38
	de País Vasco	1.770	1.896	-6,65	1.770	2.077	-14,8
	Rioja, La	7.875	6.156	27,9	7.897	6.515	21,2
		961	942	2,02	961	1.017	-5,51

INE: Instituto Nacional de Estadística; NA: no aplica; SiVIES: Sistema de Vigilancia en España; U07.1: código CIE-10 correspondiente a «COVID-19, virus identificado»; U07.2: código CIE-10 correspondiente a «COVID-19, virus no identificado».

el total de los casos (+18%). Al examinar estas diferencias por períodos ([Fig. 3](#)) se observó que el gradiente de diferencias por edad se mantuvo para todos los períodos, si bien los números eran bajos en personas < 15 años y de 15 a 44 años para mostrar tendencias claras.

La mayoría de las comunidades autónomas presentaron un menor número de fallecimientos confirmados por COVID-19 en el SiVIES ([Tabla 1](#)), siendo mayor esta diferencia en Cataluña y Galicia (-18%), seguidas de Asturias (-17%). Cinco comunidades autónomas presentaron mayor número de fallecimientos notificados en el SiVIES: Aragón y Melilla (+1,2%), La Rioja (+2,0), Ceuta (+12%) y el País Vasco (+28%). Al añadir los casos posibles y probables, la diferencia fue mayor en Madrid y Castilla y León (ambas -28%), seguidas de Cataluña (-25%). Solo Ceuta (+4,3%) y el País Vasco (+21,2%) continuaron presentando más fallecimientos en el SiVIES. La mayor diferencia entre el análisis con casos confirmados o añadiendo los casos posibles y probables fue en Castilla-La Mancha, que pasó del -2,5% al -19%. El mismo análisis, pero estratificado por períodos, puede verse en el [Material suplementario](#).

Variación en el número de fallecidos por COVID-19 en el INE al incorporar las causas de defunción fundamental e intermedia

Se calculó el porcentaje de incremento en el número de fallecimientos por COVID-19 confirmada en el INE al incorporar aquellos con el código U07.1 en apartados del certificado de defunción diferentes de la CBAS ([Tabla 2](#)). El número de fallecidos ascendería a 134.681 (+2,5%) al incluir los fallecidos con el código U07.1 en CBAS o causa fundamental. Esta diferencia sería mayor en los períodos 5 y 6 (+3,3% y +3,6%, respectivamente), en los hombres (+2,7% vs. +2,3%), en las personas de edad ≥45 y <65 años (+3,9%) y en las Islas Baleares (+3,2%).

Contabilizando la aparición del código U07.1 en CBAS, causa fundamental o causa intermedia de defunción, frente a su aparición exclusivamente en CBAS, el número total de fallecidos ascendería a 136.326 (+3,7%), siendo de nuevo mayor en los períodos 5 y 6 (+5,4% y +6,8%, respectivamente), en los hombres (+4,0% vs. +3,4%), en el grupo de edad ≥45 y <65 años (+6,4%), y en Melilla (+4,2%) e Islas Baleares (+3,6%).




Figura 2. Número de fallecidos por COVID-19 confirmada, probable o sospechosa, según sexo, periodo de mortalidad y fuente de datos (SiVIES o INE), y porcentaje de fallecidos no registrados en el SiVIES (solo para casos confirmados) por periodo de mortalidad. P1: primer periodo (del 1 de marzo al 30 de junio de 2020); P2: segundo periodo (del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020); P3: tercer periodo (del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021); P4: cuarto periodo (del 1 de junio al 31 de octubre de 2021); P5: quinto periodo (del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022); P6: sexto periodo (del 1 de mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2022).

Discusión

El número de fallecimientos por COVID-19 confirmada notificados en el SiVIES entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 fue un 10% inferior al registrado por el INE. Las diferencias son mucho más llamativas al inicio y al final de la pandemia, mientras que en los períodos centrales ambas fuentes aportan cifras más similares, con diferencias de entre el 6 y el 8%. Los resultados muestran diferencias según sexo y edad, apoyando la generación de hipótesis sobre las posibles fuentes de estas discrepancias.

Las mayores diferencias al inicio y final de la pandemia (periódos 1, 5 y 6) eran esperables, dado que la vigilancia tuvo una menor calidad o exhaustividad, al igual que ocurrió en otros países^{15,18}. En el primer periodo, la escasez de pruebas diagnósticas¹⁹ y la saturación de los servicios sanitarios resultaron en barreras de acceso²⁰. Esto pudo incrementar los fallecimientos extrahospitalarios, tanto en domicilios como en residencias de mayores^{15,21}, sin prueba diagnóstica ni una clara causa del fallecimiento^{15,21-23}, lo que justifica la disparidad en la atribución de la misma entre ambas fuentes y el incremento en las diferencias al incorporar los casos sospechosos en el primer periodo. También es posible que la incorporación retrospectiva de casos fuera menos exhaustiva para los sospechosos, por priorización y limitaciones de recursos, debido a la sobrecarga de los sistemas de vigilancia en ese periodo.

En los períodos centrales de la pandemia, las menores diferencias podrían atribuirse a la mejora del sistema de vigilancia, y la amplia disponibilidad de pruebas diagnósticas explicaría el bajo impacto de incluir los casos sospechosos respecto a considerar únicamente los confirmados en estos períodos.

En el último periodo se vuelven a observar mayores diferencias entre el SiVIES y el INE al no estar incluidos en el protocolo de vigilancia¹¹ los fallecimientos extrahospitalarios de personas <60 años que no hubieran llegado a requerir ingreso hospitalario, una circunstancia excepcional que no explicaría la magnitud de las diferencias encontradas. Es más probable que, con el fin de la alerta sanitaria y la menor percepción de riesgo relacionada con la COVID-

19, se redujera la exhaustividad diagnóstica, incluso en pacientes hospitalizados en los que sí se debería haber indicado la prueba según el nuevo (y más complejo) protocolo. También es posible que se redujera la calidad de la vigilancia en esta etapa, con menor exhaustividad en la notificación de los casos.

Podemos pensar en algunos factores diferenciales entre comunidades autónomas que podrían explicar las diferencias observadas, como la gestión de los sistemas y las bases de datos sanitarias, los protocolos o prácticas de confirmación diagnóstica, los procedimientos de seguimiento de casos hospitalizados (con inclusión o no de seguimiento posterior al alta, o cruce con bases de datos de mortalidad), los circuitos de notificación epidemiológica, especialmente de fallecimientos y sus causas, o la diferente integración de las residencias de mayores en los sistemas de vigilancia. Las diferentes hipótesis deben ser contrastadas y comprobadas en cada comunidad autónoma, para comprender, y en su caso mejorar, estos sistemas.

La diferencia entre el SiVIES y el INE es máxima en personas ≥80 años en todos los períodos, lo que podría relacionarse con una mayor proporción de fallecimientos extrahospitalarios²⁴ y la dificultad para atribuir la causa de muerte en pacientes pluripatológicos^{25,26}. En los más jóvenes, en cambio, los fallecimientos fueron más en el SiVIES, posiblemente por la elevada frecuencia de otras causas de fallecimiento en las poblaciones infantil y adolescente, en las que el SARS-CoV-2 se detecta, pero no es la causa principal²⁷. Debido al bajo número absoluto de fallecimientos en estas edades, existe una gran variabilidad en los datos.

Los resultados desagregados por sexo muestran una mayor diferencia en la notificación de fallecimientos en las mujeres, más llamativa en personas de mayor edad, especialmente ≥80 años. Nuestro análisis apunta a que se debería a un sesgo residual asociado a la edad, por la mayor esperanza de vida de las mujeres²⁸, aunque también hay estudios que han demostrado diferencias de género en la prestación de asistencia sanitaria durante la pandemia²⁹.

Entre las limitaciones de este trabajo destaca haber definido unos períodos de mortalidad no coincidentes con los períodos epi-




Figura 3. Número de fallecidos por COVID-19 confirmada, probable o sospechosa, según grupo de edad, periodo de mortalidad y fuente de datos (SiVIES o INE), y porcentaje de fallecidos no registrados en el SiVIES (solo para casos confirmados) por grupo de edad y periodo de mortalidad. P1: primer periodo (del 1 de marzo al 30 de junio de 2020); P2: segundo periodo (del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020); P3: tercer periodo (del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021); P4: cuarto periodo (del 1 de junio al 31 de octubre de 2021); P5: quinto periodo (del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022); P6: sexto periodo (del 1 de mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2022).




Figura 3. (Continuación)

démicos oficiales de la COVID-19⁶. Debido al desfase natural entre la infección y el fallecimiento, las curvas de mortalidad están retrasadas respecto a las de contagio^{6,30}, por lo que se consideró más adecuado establecer períodos de mortalidad que recogieran conjuntamente los fallecidos de cada onda epidémica. Es relevante que

los límites entre períodos no coinciden con las actualizaciones fundamentales del protocolo de vigilancia en mayo de 2020 y marzo de 2022, sino que se contempló un periodo de transición debido a la posible implementación gradual del protocolo y para captar la onda completa de fallecimientos correspondientes a los casos posi-

Tabla 2

Número de fallecimientos por COVID-19 registrados en los datos del INE según si la COVID-19 (código U07.1) consta como causa básica de defunción, causa fundamental o causa intermedia, y porcentaje de incremento, por períodos de mortalidad, sexo, grupos de edad y comunidad autónoma de residencia. España, marzo de 2020 a diciembre de 2022

Variable	Categorías	N.º fallecidos con U07.1 como causa básica	N.º fallecidos con U07.1 como causa básica o fundamental	Incremento respecto a usar solo causa básica (%)	N.º fallecidos con U07.1 como causa básica, fundamental o intermedia	Incremento respecto a usar solo causa básica o fundamental (%)	Incremento respecto a usar solo causa básica (%)
Total		131.408	134.681	2,49	136.326	1,22	3,74
Período de mortalidad	Periodo 1 (01/03/20-30/06/20)	33.312	34.085	2,32	34.390	0,89	3,24
	Periodo 2 (01/07/20-30/11/20)	20.861	21.216	1,70	21.393	0,83	2,55
	Periodo 3 (01/12/20-31/05/21)	34.901	35.654	2,16	35.868	0,60	2,77
	Periodo 4 (01/06/21-31/10/21)	7.562	7.758	2,59	7.816	0,75	3,36
	Periodo 5 (01/11/21-30/04/22)	19.043	19.679	3,34	20.065	1,96	5,37
	Periodo 6 (01/05/22-31/12/22)	15.729	16.289	3,56	16.794	3,10	6,77
Sexo	Hombre	71.655	73.559	2,66	74.516	1,30	3,99
	Mujer	59.753	61.122	2,29	61.810	1,13	3,44
Grupo de edad (años)	< 15	32	32	0,00	34	6,25	6,25
	≥ 15 y < 45	927	954	2,91	980	2,73	5,72
	≥ 45 y < 65	10.167	10.560	3,87	10.819	2,45	6,41
	≥ 65 y < 80	34.052	35.050	2,93	35.592	1,55	4,52
	> 80	86.230	88.085	2,15	88.910	0,94	3,11
Comunidad autónoma	Andalucía	16.938	17.274	1,98	17.304	0,17	2,16
	Aragón	5.388	5.477	1,65	5.487	0,18	1,84
	Asturias, Principado de	3.801	3.805	0,11	3.806	0,03	0,13
	Baleares, Islas	1.746	1.802	3,21	1.809	0,39	3,61
	Canarias	2.409	2.427	0,75	2.429	0,08	0,83
	Cantabria	1.074	1.099	2,33	1.106	0,64	2,98
	Castilla y León	11.063	11.169	0,96	11.184	0,13	1,09
	Castilla-La Mancha	8.240	8.283	0,52	8.297	0,17	0,69
	Cataluña	25.117	25.374	1,02	25.418	0,17	1,20
	Ceuta	173	175	1,16	176	0,57	1,73
	Comunidad Valenciana	11.218	11.380	1,44	11.414	0,30	1,75
	Extremadura	3.053	3.118	2,13	3.133	0,48	2,62
	Galicia	4.896	4.978	1,67	5.006	0,56	2,25
	Madrid, Comunidad de	24.445	24.739	1,20	24.850	0,45	1,66
	Melilla	168	171	1,79	175	2,34	4,17
	Murcia, Región de	2.685	2.722	1,38	2.729	0,26	1,64
	Navarra, Comunidad	1.896	1.929	1,74	1.939	0,52	2,27
	Foral de						
	País Vasco	6.156	6.181	0,41	6.183	0,03	0,44
	Rioja, La	942	950	0,85	952	0,21	1,06

U07.1: código CIE-10 correspondiente a «COVID-19, virus identificado».

blemente diagnosticados con anterioridad al cambio de protocolo. Además, no se utilizó directamente la fecha clave reportada por las comunidades autónomas; en su lugar, se recalcó a partir de los datos básicos disponibles, aplicando el mismo algoritmo teórico empleado por las comunidades autónomas con el fin de corregir posibles inconsistencias en su consignación entre territorios.

Al igual que se hizo durante la pandemia, se consideró que los casos de COVID-19 notificados al SiVIES fallecidos por causa desconocida eran fallecimientos por COVID-19, si bien solo fueron 263 fallecimientos (0,2% del total)³¹. Se eliminaron del SiVIES un 0,2% de fallecimientos con sexo o edad desconocidos, se utilizó la comunidad autónoma de notificación en vez de la de residencia en un 0,4% de los fallecimientos en el SiVIES y en un 0,3% en el INE, y la fecha de fallecimiento fue imputada en 975 (0,8%) fallecimientos en el SiVIES, ignorando ligeras diferencias en la mediana desde la hospitalización hasta el fallecimiento por períodos (rango 10-14 días vs. mediana global 13 días).

Por último, al tratarse de un estudio ecológico no es posible verificar las hipótesis sobre el origen de las diferencias encontradas. Sería importante realizar estudios de base individual, idealmente

mediante la revisión de casos concretos, para establecer recomendaciones específicas de mejora.

Establecer la causa de la muerte es un proceso complejo, dado que es un evento competitivo en el que diversas condiciones pueden influir de manera simultánea^{16,32}. La dificultad y la variabilidad en los algoritmos de atribución de la causa de muerte, así como el factor humano en la codificación, podrían explicar parcialmente los resultados obtenidos. En nuestro análisis, la inclusión de la causa intermedia o fundamental en el análisis solo incrementó como máximo un 3,7% el número de fallecimientos registrados por el INE, mostrando que la utilización de la CBAS captura la mayor parte de los casos de fallecimientos por COVID-19. Sería preciso un análisis pormenorizado de los casos con códigos U07.1 en la causa fundamental o intermedia para comprender la validez de la utilización de la CBAS.

En conclusión, los datos de fallecimientos por COVID-19 ofrecidos por el SiVIES se aproximaron a los obtenidos de una fuente consolidada como es el INE, especialmente en los períodos centrales de la pandemia. Nuestros resultados muestran la validez y la calidad que tuvo esta vigilancia individualizada en tiempo real, indispen-

sable para monitorizar el impacto de la COVID-19 e informar la toma de decisiones sobre su control. Las diferencias por subgrupos ayudan a generar hipótesis sobre las causas de estas diferencias y aportan información útil de cara a la preparación frente a futuras situaciones similares.

Disponibilidad de bases de datos y material para réplica

Datos disponibles a petición: bases del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en España; ver información de contacto del autor de correspondencia.

Datos disponibles de un tercero: microdatos anonimizados de mortalidad por causas; Instituto Nacional de Estadística (<https://www.ine.es/infoine>).

¿Qué se sabe sobre el tema?

La información diaria sobre los fallecimientos por COVID-19 proporcionada por la vigilancia epidemiológica en España durante la pandemia fue clave para la toma de decisiones en tiempo real, aunque pudo ser incompleta, contener errores o sufrir retrasos.

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?

Compara la mortalidad por COVID-19 notificada a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica con los datos consolidados del Instituto Nacional de Estadística entre 2020 y 2022.

¿Cuáles son las implicaciones de los resultados obtenidos?

El estudio respalda la utilidad y la calidad de la vigilancia epidemiológica en contextos de crisis, proporcionando información cercana a una fuente consolidada como el Instituto Nacional de Estadística.

Editor responsable del artículo

Alberto Lana.

Declaración de transparencia

La autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a GACETA SANITARIA, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Contribuciones de autoría

S. Campos y S. Monge diseñaron el estudio. S. Campos realizó el análisis de los datos y escribió la primera versión del manuscrito, con la supervisión y el apoyo de S. Monge, y con aportaciones del resto de las personas firmantes, que participaron activamente en las decisiones de análisis, interpretación y discusión de resultados, y revisaron críticamente el contenido del artículo.

Financiación

Ninguna.

Conflictos de intereses

Ninguno.

ANEXO. MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2025.102523>.

Bibliografía

1. World Health Organization. WHO timeline – COVID-19. Geneva: WHO; 2020. (Consultado el 10/06/2025.) Disponible en: <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline-covid-19>.
2. Organización Mundial de la Salud. Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Geneva: OMS; 2020. (Consultado el 10/06/2025.) Disponible en: [https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov](https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).
3. World Health Organization. WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. Geneva: WHO; 2020. (Consultado el 10/06/2025.) Disponible en: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020>.
4. Ministerio de Sanidad. Orden SND/726/2023, de 4 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023, por el que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2023. (Consultado el 10/06/2025.) Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/o/2023/07/04/snd726>.
5. Ministerio de Sanidad. Actualización n.º 672. Enfermedad por coronavirus (COVID-19). Madrid: Ministerio de Sanidad; 2023. (Consultado el 27/10/2024.) Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/alertasEmergenciasSanitarias/alertasActuales/nCov/documentos/Actualizacion_672_COVID-19.pdf.
6. Instituto de Salud Carlos III. Informe n.º 182. Situación actual de COVID-19 en España a 5 de julio de 2023. Madrid: ISCIII; 2023. (Consultado el 27/10/2024.) Disponible en: <https://cne.isciii.es/documents/d/cne/informe-n-182-situacion-actual-de-covid-19-en-espana-a-5-de-julio-de-2023>.
7. Rao C, de Savigny D, Atuheire E, et al. The role of mortality surveillance in pandemic preparedness and response. Bull World Health Organ. 2025;103:213–22.
8. Setel P, AbouZahr C, Atuheire EB, et al. Mortality surveillance during the COVID-19 pandemic. Bull World Health Organ. 2020;98:374.
9. Gobierno de España. Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica. BOE núm. 21, de 24/01/1996. (Consultado el 10/06/2025.) Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/12/28/2210/con>.
10. Gobierno de España. Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional. BOE núm. 133, de 12/05/2020. (Consultado el 07/01/2025.) Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf>.
11. Ministerio de Sanidad. Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2022. (Consultado el 10/06/2025.) Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf.
12. Ministerio de Sanidad. Alertas y emergencias sanitarias. Informes previos. Madrid: Ministerio de Sanidad; s.f. (Consultado el 10/06/2025.) Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/areas/alertasEmergenciasSanitarias/alertasActuales/nCov/ITCoronavirus/informesPrevios.htm>.
13. Centro Nacional de Epidemiología. Vigilancia de COVID-19 durante la pandemia. (Consultado el 10/06/2025.) Disponible en: <https://cne.isciii.es/es/covid-19-pandemia>.
14. Hamilton JI, Turner K, Lichtenstein Cone M. Responding to the pandemic: challenges with public health surveillance systems and development of a COVID-19 national surveillance case definition to support case-based morbidity surveillance during the early response. J Public Health Manag Pract. 2021;27 (Suppl 1):S80.
15. Renard F, Scohy A, Van Der Heyden J, et al. Establishing an ad hoc COVID-19 mortality surveillance during the first epidemic wave in Belgium, 1 March to 21 June 2020. Euro Surveill. 2021;26:2001402.
16. Instituto Nacional de Estadística. Metodología de la estadística de defunciones según la causa de muerte. Madrid: INE; 2024. (Consultado el 06/01/2025.) Disponible en: https://www.ine.es/daco/daco42/sanitarias/metodologia_00.pdf.
17. Instituto Nacional de Estadística. Estadística de defunciones según la causa de muerte. Nota metodológica. Avance enero 2020 - mayo 2020. Madrid: INE; 2020. (Consultado el 06/01/2025.) Disponible en: <https://www.ine.es/daco/daco42/sanitarias/metodologia.avance2020.pdf>.

18. Nightingale ES, Abbott S, Russell TW. The local burden of disease during the first wave of the COVID-19 epidemic in England: estimation using different data sources from changing surveillance practices. *BMC Public Health*. 2022;22:716.
19. Instituto de Salud Carlos III. COVID-19. Documentación y datos. (Consultado el 06/01/2025.) Disponible en: <https://cnecovid.isciii.es/covid19/#documentacion-y-datos>.
20. Ministerio de Sanidad. Documentos técnicos para profesionales – Coronavirus. (Consultado el 07/04/2025.) Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/areas/alertasEmergenciasSanitarias/alertasActuales/nCov/documentos.htm>.
21. Firestone MJ, Thorell L, Kollmann L, et al. Surveillance for unexplained deaths of possible infectious etiologies during the COVID-19 pandemic – Minnesota, 2020–2021. *Public Health Rep*. 2024;139:325–32.
22. Instituto Nacional de Estadística. Estadística de defunciones según la causa de muerte. Año 2020. (Consultado el 07/04/2025.) Disponible en: https://ine.es/prensa/edcm_2020.pdf.
23. Dutey-Magni PF, Williams H, Jhass A, et al. COVID-19 infection and attributable mortality in UK care homes: cohort study using active surveillance and electronic records (March–June 2020). *Age Ageing*. 2021;50:1019–28.
24. Grupo de Trabajo COVID-19 en Residencias. Informe sobre la situación en centros residenciales en España. 2020. (Consultado el 07/04/2025.) Disponible en: https://imserso.es/documents/20123/117116/gtcovid_residencias_vf.pdf.
25. González RB, Díaz BS. El certificado médico de defunción. *Galicia Clínica*. 2022;83:27–30.
26. Funk T, Innocenti F, Dias JC, et al. Age-specific associations between underlying health conditions and hospitalisation, death and in-hospital death among confirmed COVID-19 cases: a multi-country study based on surveillance data, June to December 2020. *Euro Surveill*. 2022;27:2100883.
27. Bertran M, Amin-Chowdhury Z, Davies HG, et al. COVID-19 deaths in children and young people in England, March 2020 to December 2021: an active prospective national surveillance study. *PLoS Med*. 2022;19:e1004118.
28. Instituto Nacional de Estadística. Productos y servicios. Publicaciones de descarga gratuita. (Consultado el 06/01/2025.) Disponible en: https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLLayout¶m1=PYSDetalle¶m3=1259924822888.
29. Aguilar-Palacio I, Maldonado L, Malo S, et al. COVID-19 inequalities: individual and area socioeconomic factors (Aragón, Spain). *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18:6607.
30. Tancredi S, Cullati S, Chiolero A. Surveillance bias in the assessment of the size of COVID-19 epidemic waves: a case study. *Public Health*. 2024;234:98–104.
31. Instituto de Salud Carlos III. Informe n.º 19. Situación de COVID-19 en España a 1 de abril de 2020. Madrid: ISCIII; 2020. (Consultado el 06/01/2025.) Disponible en: <https://cne.isciii.es/documents/d/cne/informe-n-19-situacion-de-covid-19-en-espana-a-1-de-abril-de-2020-pdf>.
32. Instituto Nacional de Estadística. Artículo de doctrina. Año 2016. Madrid: INE; 2016. (Consultado el 06/01/2025.) Disponible en: https://www.ine.es/GS_FILES/DocTrabajo/art.doctr012016.pdf.