

GS a primera vista

Número 1, Volumen 24, Enero-febrero 2010

NOTA EDITORIAL

Se hace camino al andar

Esteve Fernández, Fernando Antoñanzas, Mireia Espallargues, Iñaki Galán, Pere Godoy, María José López, Juan Oliva, Glòria Pérez, Santiago Perez-Hoyos, Enrique Regidor, Alberto Ruano y Antonio Sarría-Santamera

El Comité Editorial de GACETA SANITARIA hace balance de 2009, un año con cifra récord de manuscritos recibidos (75 más que en 2008) y un total de 134 artículos publicados. 2009 también ha sido el año de la consolidación de apuestas editoriales como el sistema de gestión de manuscritos por Internet, el nuevo formato de los artículos, la publicación casi inmediata de los artículos aceptados como avance online y la publicación de artículos sólo en línea.

ORIGINALES

Variabilidad en la utilización de los servicios de urgencias hospitalarios del Sistema Nacional de Salud

Salvador Peiró, Julián Librero, Manuel Ridao, Enrique Bernal-Delgado y Grupo de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud

El estudio busca, entre otros objetivos, analizar las diferencias entre áreas geográficas a la hora de utilizar los servicios de urgencias hospitalarios. Los datos se obtuvieron de 164 áreas de salud que en 2006 daban cobertura al 79% de la población española. Los 35,3 millones de habitantes de estas áreas realizaron 16,2 millones de visitas a urgencias, lo que supone una tasa de 45,7 visitas por cada 100 habitantes. De ellos, ingresaron algo más de 2 millones (el 12,6%). Existen, sin embargo, marcadas diferencias entre áreas de salud, ya que la frecuentación osciló entre 31,6 y 78,7 urgencias por cada 100 habitantes. Por comunidades autónomas, Cantabria, Cataluña y Andalucía son las que presentan mayores tasas de urgencias (más de 50 por cada 100 habitantes), mientras que Canarias presenta las cifras más bajas (34 por cada 100).

Impacto de la morbilidad, uso de recursos y costes en el mantenimiento de la remisión de la depresión mayor en España: estudio longitudinal de ámbito poblacional

Antoni Sicras-Mainar, Milagrosa Blanca-Tamayo, Laura Gutiérrez-Nicuesa, Jordi Salvatella-Pasant y Ruth Navarro Artieda

La depresión mayor es uno de los diagnósticos psiquiátricos más habituales en la población general, con una prevalencia por año estimada del 3,9%, y con unos costes muy elevados. Este trabajo evalúa los costes directos e indirectos en el manteni-

miento de la remisión de esta enfermedad y en situación de práctica clínica habitual. El 54,6% de los 4.572 sujetos reclutados con depresión mayor se consideraron en remisión. Con un promedio de 11,5 visitas por año y de 31 días de incapacidad laboral, el coste medio sanitario de los pacientes en remisión es de 706 €, mientras que las pérdidas de productividad laboral ascienden a 1.609 €. Los pacientes sin remisión, en cambio, presentan un promedio de 14,4 visitas por año y de 38,5 días de incapacidad. Los costes directos son de 1.108 € y los indirectos suman 2.282€ por paciente.

Veintidós años de evolución de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad en la ciudad de Barcelona

Albert Dalmau-Bueno, Anna García-Altés, Marc Marí-Dell'Olmo, Katherine Pérez, Anton E. Kunst y Carme Borrell

El estudio analiza las desigualdades en la mortalidad por todas las causas en las diferentes Áreas Básicas de Salud (ABS) de Barcelona, según el grupo de edad y el sexo, entre 1983 y 2004. Tras analizar el registro de mortalidad, el padrón municipal y el censo de habitantes, los resultados demuestran que las tasas de mortalidad específica (TME) son mayores en las ABS menos favorecidas, aunque durante la última década disminuyeron en toda Barcelona. De esta manera, aunque existen desigualdades entre las diferentes zonas, éstas se han reducido en los últimos veinte años, a excepción de en las mujeres de 20 a 39 años, en las cuales las desigualdades relativas se mantienen estables.

Variaciones en la estimación de la prevalencia de artrosis de rodilla según los criterios diagnósticos utilizados en os estudios poblacionales

Mercè Comas, Maria Sala, Rubén Román, Lorena Hoffmeister y Xavier Castells

La artrosis es la enfermedad articular más frecuente, aunque su prevalencia no se conoce con exactitud. Este estudio constata las variaciones en la estimación de la prevalencia de artrosis de rodilla tras analizar ocho artículos científicos que utilizaban criterios diagnósticos distintos. De esta manera, las prevalencias obtenidas en los diferentes trabajos a partir de distintos criterios varían del 1,5 al 42,4%. Esta variabilidad es mayor en las mujeres y en aquellos estudios que usaron exclusivamente criterios sintomáticos para la definición de la enfermedad. No existe, por tanto, un consenso en los criterios utilizados para diagnosticar la artrosis de rodilla en los estudios poblacionales de prevalencia.

Noticias de prensa sobre errores clínicos y sensación de seguridad al acudir al hospital

José Joaquín Mira, Mercedes Guilabert, Lidia Ortíz, Isabel María Navarro, María Virtudes Pérez-Jover y Jesús María Aranaz

El estudio tiene como objetivo analizar el tratamiento informativo de tres periódicos de tirada nacional y tres del ámbito de la Comunidad Valenciana sobre los errores clínicos y su influencia sobre los pacientes que acuden a un hospital. Entre abril y noviembre de 2007, 90 casos generaron 128 noticias, con una media de 16 impactos mensuales. En el 71% de las informaciones se contrastó la fuente. El error se atribuyó al sistema en el 46,5% de las ocasiones, a los profesionales en el 21,3% y a ambos en el 32,3%. Tras entrevistar a 829 pacientes de hospital, el 61,9% afirmó haber visto u oído recientemente noticias sobre errores clínicos. Entre ellos se encontraban los que creían que tenían mayor probabilidad de sufrir un error y los que tenían menos confianza en el hospital.

Incremento en la prevalencia del VIH y en las conductas de riesgo asociadas en hombres que tienen sexo con hombres: 12 años de encuestas de vigilancia conductual en Cataluña

Cinta Folch, Jordi Casabona, Rafael Muñoz, Victoria González y Kati Zaragoza

El 52,3% de los nuevos diagnósticos de VIH en hombres catalanes en 2006 fueron fruto de relaciones homosexuales. Esta investigación analiza las encuestas y las muestras de saliva que durante 12 años ha llevado a cabo el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del VIH/ITS. Tras entrevistar de forma anónima a más de 4.400 hombres y obtener 1.860 muestras de saliva entre 1995 y 2006, los resultados muestran un aumento de la prevalencia global del VIH del 8,5% en 1995 al 14,1% en 2006 en los menores de 30 años, y del 18,2% al 21,2% en los mayores de 30. Las conductas de riesgo también han aumentado durante el periodo. El uso de preservativo con parejas ocasionales descendió del 72,9% al 58,7% en los menores de 30 años, y del 77,2% al 65,6% en los de 30 años y más.

Violence in adolescents: social and behavioural factors

Sandra Sousa, Teresa Correia, Elisabete Ramos, Sílvia Fraga y Henrique Barros

Los autores estiman la prevalencia de la participación de los jóvenes en peleas y de ser físicamente, sexualmente o emocionalmente maltratados tras realizar un cuestionario anónimo en 7.511 adolescentes de 15 a 19 años matriculados en escuelas públicas portuguesas. El 15,6% de los jóvenes manifestó haber sufrido violencia emocional, siendo así la más prevalente. Los chicos indicaron más participación en peleas que las chicas (13,6% frente al 3,6%) y mayor maltrato físico (19,5% frente al 7,5%). No se detectaron diferencias significativas entre sexos en lo que se refiere al maltrato emocional y el abuso sexual. En ambos, la edad disminuye las probabilidades de participar en peleas pero aumenta las posibilidades de abuso emocional. A mayor educación de los padres, mayor probabilidad de abuso emocional en chicas y de participación en peleas en chicos.

Posicionamiento de padres y madres ante el consumo de alcohol en población de 12 a 17 años en el ámbito urbano de seis Comunidades Autónomas

Joan Carles March Cerdá, María Ángeles Prieto Rodríguez, Alina Danet, Ainhoa Ruiz Azarola, Noelia García Toyos y Paloma Ruiz Román

Estudios recientes sitúan la media de edad de inicio en el consumo de alcohol alrededor de los 12-13 años y revelan que más del 70% de los adolescentes beben alcohol con cierta frecuencia.

Este trabajo cualitativo realizado con 42 padres y madres de zonas urbanas busca conocer su discurso social predominante. En general, madres y padres no consideran que el consumo moderado y ocasional de alcohol de sus hijos sea un problema. Los padres son más partidarios de la autoridad y el control como medida preventiva, mientras que las madres prefieren la vía educativa y la comunicación. Los progenitores culpan en parte a las autoridades de la desinformación y las escasas alternativas de ocio juvenil, aunque aceptan positivamente las medidas legales como la prohibición de la venta de alcohol y de la publicidad.

Análisis de coste-utilidad del manejo de la fibrilación auricular concomitante en España

María Jesús López Gude, Desiré Rodríguez Bezos y José Manuel Rodríguez Barrios

La fibrilación auricular (FA) es el trastorno cardíaco más común en la práctica clínica. En España, afecta al 8,5% de la población mayor de 60 años. El objetivo de este estudio es realizar un análisis de coste-utilidad de las diferentes opciones de tratamiento en pacientes mayores de 40 años con FA concomitante. Los años de vida ajustados por calidad ganados fueron 3,29, 3,89 y 3,83 para las alternativas de no ablación, la ablación quirúrgica y la ablación por catéter respectivamente, mientras que los costes por paciente fueron de 5.770 €, 10.034 € y 11.289 €. La opción de tratamiento más coste-efectiva fue la ablación quirúrgica, con una razón coste-efectividad por debajo del umbral de eficiencia comúnmente aceptado en España.

Expectativas de los pacientes sobre la toma de decisiones ante diferentes problemas de salud

Ana Delgado, Luis Andrés López-Fernández, Juan de Dios Luna, Lorena Saletti Cuesta, Natalia Gil Garrido y Almudena Puga González

Este estudio transversal y multicéntrico busca conocer las expectativas del paciente sobre la toma de decisiones clínicas ante cinco problemas de salud hipotéticos y las características de paciente y médico relacionadas con dichas expectativas. Tras encuestar a 357 usuarios de 14 centros de salud andaluces, los resultados demuestran que el número de pacientes que desea participar en la toma de decisiones clínicas no es alto y varía según la enfermedad. Como máximo, el 43% desea compartir la decisión con el médico y el 6,4% desea decidir solo en caso de problema familiar. En los otros cuatro problemas (dolor fuerte en el pecho, resfriado con fiebre, flujo anormal y depresión o tristeza), entre el 60 y el 68% de los pacientes prefiere que decida su médico de familia.

ORIGINAL BREVE

El tabaco en los establecimientos de restauración y hostelería: estudio observacional en Barcelona, 2008

Joan R. Villalbí, Lucía Baranda, M. José López y Manel Nebot

Tras la entrada en vigor en 2006 de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, mediante la cual los locales de restauración y hostelería tienen amplio margen para decidir, esta investigación describe la situación real a partir del muestreo de 1.130 establecimientos de Barcelona. En el 75,4% de los locales se permite fumar libremente (el 21,6% son totalmente libres de humo y el 3% cuenta con zonas habilitadas). En la mayoría de comercios con degustación y

en los establecimientos de comida rápida se prohíbe fumar (85%). En contraste, es general permitir fumar en los bares-cafeterías (90,7%) y las cafeterías-restaurantes (87,9%). En el centro de la ciudad y los centros comerciales es donde más se concentran los locales libres de humo o con zonas habilitadas.

NOTAS DE CAMPO

La retirada de una campaña publicitaria para promoción de la vacuna tetravalente del virus del papiloma humano en España

Marta Martín-Llaguno y Carlos Álvarez-Dardet

El artículo describe la polémica puesta en marcha de dos campañas de comunicación avaladas por sociedades científicas para informar sobre el cáncer de cuello de útero pero tras las cuales se sospechaba que estaba la farmacéutica que comercializa la controvertida vacuna tetravalente del virus del papiloma humano. Tras una querrela por publicidad engañosa que no se admitió a trámite y una reclamación realizada por la plataforma para la moratoria de esta vacuna ante Autocontrol (el organismo de autocontrol de la publicidad en España), Sanofi Pasteur MSD, anunciante no mencionado, acepta la reclamación y da de baja la web, corroborando así su implicación.

Intervención preventiva en lugares de interacción social de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres

Isabel Hurtado, Ignacio Alastrue, Patricia García de Olalla, Damián Albiach, Marian Martín y Santiago Pérez-Hoyos

El trabajo presenta la intervención para la prevención del VIH que se llevó a cabo en saunas y pisos frecuentados por hombres que mantienen relaciones homosexuales de Valencia. Durante seis meses se habló con 500 hombres que frecuentaban saunas y que ejercían la prostitución en pisos. El 35% conocía el Centro de Información y Prevención del Sida (CIPS) de Valencia. Posteriormente, se les ofrecía la posibilidad de realizarse las pruebas serológicas para el VIH y la sífilis, a las cuáles accedieron 171. La prevalencia del VIH encontrada fue del 1,6% en las saunas y del 11% en los pisos. La mitad de los sujetos de las saunas fueron a recoger los resultados al CIPS, y una tercera parte de los hombres de los pisos.

ARTÍCULOS ESPECIALES

Epidemiología de la infección por VIH en inmigrantes en España: fuentes de información, características, magnitud y tendencias

Ana María Caro-Murillo, Jesús Castilla Catalán y Julia del Amo Valero

El trabajo resume las fuentes de información que existen en la actualidad para estudiar la epidemiología de la infección por VIH en inmigrantes en España, ya que no existe un registro nacional que especifique la procedencia. Teniendo en cuenta multitud de estudios realizados, este artículo concluye que la presencia de inmigrantes entre las personas VIH positivas en España es creciente en porcentaje, pero estable en números absolutos y decreciente en tasas de incidencia. Todas las fuentes consultadas muestran que entre los inmigrantes con infección por VIH hay una mayor proporción de mujeres y de personas más jóvenes que en el caso de los españoles. El lugar de origen más frecuente entre los inmigrantes VIH positivos es Latinoamérica, seguido de África subsahariana y otros países de Europa occidental.

Recomendaciones para una futura Ley de Salud Pública en España

Rosa Urbanos, en nombre del Grupo de Trabajo de SESPAS sobre una Futura Ley Estatal de Salud Pública

Resumen del informe elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) con las principales recomendaciones estratégicas sobre el contenido de la futura ley de salud pública española. El texto legal debería abrir paso a la modernización y a la adaptación de las estructuras de salud pública a las nuevas necesidades. Se precisa un concepto más amplio de salud pública y una redefinición de sus funciones y servicios básicos. La creación de una Agencia Española de Salud Pública y de un Consejo de Salud Pública, la elaboración de una Estrategia Española de Salud Pública y la reforma de la formación de los profesionales son algunas de las principales recomendaciones para la futura ley.

CARTAS AL DIRECTOR

¿Se puede predecir la epidemia de gripe mediante datos de búsquedas en Internet?

Antonio Valdivia Pérez, Ángel Miguel Benito, Esperanza Escortell Mayor y Susana Monge Corella

Los autores sugieren una fuente de información coste-efectiva para predecir las epidemias de gripe complementaria a los sistemas de vigilancia convencionales: las búsquedas de los usuarios a través de Google. Desde la semana epidemiológica 1/2004 hasta la 28/2009 se estimaron las búsquedas de términos relacionados con la gripe (TRG). Los más asociados con epidemia incluyeron síntomas (tos, mocos, fiebre y disnea) y diagnósticos asociados con la gripe (gripe, catarro, faringitis y neumonía). Con el punto de corte seleccionado se predijo la epidemia de gripe con una sensibilidad del 95,7% y una especificidad del 91,7%. Se detectó un incremento de las búsquedas de TRG la semana antes de que el Sistema de Vigilancia de la Gripe detectara un exceso de casos.

Validez de los indicadores de la calidad de la prescripción de antiasmáticos calculados en dosis diarias definidas

Francisco Caamaño y Rosa Álvarez-Gil

Los autores de un artículo publicado en GACETA SANITARIA hace un año, presentan ahora en esta carta un estudio de validación de los indicadores de prescripción de antiasmáticos calculados en dosis diaria definida (DDD) utilizando como patrón oro el cálculo en dosis diaria prescrita (DDP). Los resultados sugieren que la utilización de las DDD en los indicadores de prescripción de antiasmáticos presenta una sensibilidad sustancialmente mejorable.

IMAGINARIO COLECTIVO

Amor: Dejar a la salud pública de lado

Selección de poemas de la poeta uruguaya Idea Vilariño en los que se plasma la relación del amor con la salud. ¿Por qué debería la salud pública ocuparse también de los problemas del amor? ¿Y si dejásemos a los grandes amores fuera del ámbito y alcance de la salud pública?